

アグレプト液剤 (第 13823 号)

2023 年 3 月 13 日現在

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ストレプトマイシンを含む農薬の総使用回数 |
|-------|--------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| もも | せん孔細菌病 | 1000～2000 倍 | 200～700L/10a | 収穫 60 日前まで | 2 回以内 | 散布 | 2 回以内 |
| イチゴ | かいよう病 | 1000 倍 (200ppm) | — | 収穫後から落葉前まで | 1 回 | 樹幹注入 | 4 回以内 (樹幹注入は 1 回以内) |
| キャベツ | 黒腐病 | 2000 倍 | 100～300L/10a | 収穫 14 日前まで | 2 回以内 | 散布 | 2 回以内 |
| レタス | 腐敗病 | | | | 3 回以内 | | 3 回以内 |
| はくさい | 軟腐病 | 1000～2000 倍 | 100～300L/10a | 収穫 7 日前まで | 5 回以内 | | 5 回以内 |
| たまねぎ | | 1000 倍 | | | 100～300L/10a | | 収穫 30 日前まで |
| こんにゃく | 腐敗病 | | 1000 倍 | 100～300L/10a | | | |
| ばれいしょ | 軟腐病 | 1000～2000 倍 | 100～300L/10a | 収穫 7 日前まで | 5 回以内 | | 種いも散布 |
| | そうか病 | 10 倍 | 200～300mL / 種いも 100kg | 植付前 | 1 回 | 5～10 秒間 種いも浸漬 | |
| | | 60～100 倍 | 2.5～3L / 種いも 100kg | | | 種いも散布 | |
| | 黒あし病 | 10 倍 | 300mL / 種いも 100kg | | | 5～10 秒間 種いも浸漬 | |
| | | 60～100 倍 | — | | | 種いも散布 | |
| | | | 3L / 種いも 100kg | | | 種いも散布 | |

| 作物名 | 使用目的 | 使用濃度 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ストレプトマイシンを含む農薬の総使用回数 |
|-----|------|-----------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------|
| ぶどう | 無種子化 | 1000 倍 (200ppm) | 200～700L/10a | 満開予定日の 14 日前～開花始期 | 1 回 | 散布 | 1 回 |
| | | | 30～100L/10a | | | 花房散布 | |
| | | | — | 満開予定日の 14 日前～満開期 | | 花房浸漬 | |
| | | | — | | | 花房浸漬 (第 1 回目ジベレリン処理と併用) | |

