

7. 適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カサマインを含む農薬の総使用回数	銅を含む農薬の総使用回数	
かんきつ (みかんを除く)	かいよう病	1000 倍	200～ 700L/10a	収穫 45 日前 まで	5 回以内	散布	5 回以内	—	
みかん				収穫 7 日前 まで					
なし	黒星病			収穫後 (10 月～11 月)	2 回以内		2 回以内		
もも	せん孔細菌病 縮葉病	500 倍		開花前まで	3 回以内		3 回以内		
びわ	灰斑病 がんしゅ病	1000 倍		幼果期まで					
キウイ フルーツ	かいよう病 花腐細菌病	500 倍		休眠期 発芽後叢生期 (新梢長約 10cm) まで	4 回以内		4 回以内 (樹幹注入 は 1 回以内)		
		1000 倍		100～ 300L/10a	いんげんまめ		かさ枯病		収穫 30 日前 まで
あずき	褐斑細菌病 茎腐細菌病				収穫前日まで		5 回以内		5 回以内
きゅうり	斑点細菌病 うどんこ病 べと病								
すいか	うどんこ病 褐斑細菌病 果実汚斑細菌病				収穫 3 日前 まで		5 回以内		5 回以内
メロン	うどんこ病 斑点細菌病 果実汚斑細菌病		収穫前日まで						
トマト ミニトマト	葉かび病 輪紋病、疫病 斑点細菌病 かいよう病 軟腐病		収穫前日まで		4 回以内	4 回以内			
ピーマン とうがらし類	うどんこ病 斑点細菌病 斑点病		収穫 7 日前 まで		3 回以内	3 回以内			
キャベツ	黒腐病 軟腐病 黒斑細菌病		収穫 14 日前 まで		4 回以内	4 回以内			
セルリー	軟腐病 斑点病				3 回以内	3 回以内			
ブロッコリー	黒腐病		4 回以内		4 回以内				
だいこん	軟腐病 黒斑細菌病 ワッカ症	2 回以内 5 回以内	3 回以内	3 回以内					
ねぎ	軟腐病		2 回以内	2 回以内					
たまねぎ			5 回以内	5 回以内					
ごぼう	黒斑細菌病	3 回以内	3 回以内						
レタス 非結球レタス	腐敗病 斑点細菌病	4 回以内	4 回以内						

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カサマイシンを含む農薬の総使用回数	銅を含む農薬の総使用回数
なばな類	黒腐病	1000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内	—
にんにく	春腐病			5 回以内	5 回以内			
ばれいしょ	軟腐病	500～800 倍		収穫 7 日前まで	3 回以内		4 回以内(種いも浸漬は 1 回以内、植付後は 3 回以内)	
	疫病	800 倍						
てんさい	褐斑病	800～1000 倍		25L/10a	5 回以内		5 回以内	
	斑点病 斑点細菌病	200 倍						
にんじん	黒葉枯病 軟腐病 斑点細菌病	1000 倍	100～300L/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内		2 回以内	
	オクラ			葉枯細菌病	収穫開始 7 日前まで		3 回以内	
メキャベツ	黒腐病			収穫 21 日前まで				
茶	輪斑病 赤焼病	500～1000 倍	200～400L/10a	摘採 14 日前まで	2 回以内		2 回以内	
	新梢枯死症 (輪斑病菌による) 褐色円星病 炭疽病							
ばら	うどんこ病	1000 倍	100～300L/10a	発病初期	6 回以内	6 回以内		
ほおずき	軟腐病 斑点細菌病							
ゆり	軟腐病							
たばこ	疫病						100～180L/10a	収穫 10 日前まで