

7. 適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	イダクアブライド を含む農薬の 総使用回数	プロベナゾール を含む農薬の 総使用回数
湛水直播 水稻	いもち病 イネヌズウムシ	1kg/10a	は種時	1 回	は種同時 施薬機を 用いて土 中施用す る。	3 回以内 (は種時までの 処理は 1 回以 内、本田での散 布は 2 回以内)	2 回以内 (は種時まで の処理は 1 回以内)
稲	いもち病 イネヌズウムシ イネトオムシ ツマグロヨコバイ ウカ類		移植時		側条施用	3 回以内 (は種時 (直播) 又は移植時 までの処理は 1 回以内、本田で の散布は 2 回以内)	2 回以内 (移植時まで の処理は 1 回以内)
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 イネヌズウムシ イネトオムシ ツマグロヨコバイ ウカ類	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌 約 5L) 1 箱当り 50g 高密度には種する場 合は 1kg/10a (育苗 箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当 り 50~100g)	移植 2 日前 ~移植当日		育苗箱の苗 の上から 均一に散 布する。	3 回以内 (移植時までの 処理は 1 回以 内、本田での散 布は 2 回以内)	