

## 7. 適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	チフルザミドを含む農薬の総使用回数	プロベナゾールを含む農薬の総使用回数
湛水 直播 水稻	いもち病 イネミズウムシ イネトロオウムシ	1kg/10a	は種時	1 回	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	1 回	3 回以内 (は種時までの処理は 1 回以内、本田では 2 回以内)	2 回以内 (は種時までの処理は 1 回以内)
稲	いもち病 イネミズウムシ イネトロオウムシ		移植時		側条施用		3 回以内 (直播では種時又は移植時までの処理は 1 回以内、本田では 2 回以内)	2 回以内 (移植時までの処理は 1 回以内)
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 紋枯病 イネミズウムシ イネトロオウムシ ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ		育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約 5L) 1 箱当り 50g  高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約 5L)1 箱当り 50～100g)		移植 3 日前～ 移植当日		育苗箱の苗の上から均一に散布する。	